

REMEDIUM420-Dosierungsempfehlungen nach NRF

Zubereitung	Bioverfügbarkeit	Max. Pharmakonzentration	Anfangsdosis	Dosierungsverlauf
Cannabisblüten zur Inhalation nach Verdampfung (gemahlen) NRF 22.12.	25-27%	3 min	25 -50mg Inhalation mit Verdampfer 1x täglich	Steigerung der Dosis um 25–50mg alle 1-3 Tage , je nach THC-Gehalt der Blüte
Cannabisvollspektrumextrakte (Auszugsmittel Ethanol, in Traubenkernöl)	4-12% First-Pass-Effekt	30 min – 4h	Einnahme mit fetthaltiger Nahrung, nicht mit Wasser 1-2,5mg (4 Tropfen) 1-2x täglich	Steigerung um 2,5mg (4Tropfen) alle 3 Tage , bei unzureichender Linderung der Beschwerden. Keine weitere Dosisanpassung bei ausreichender Linderung. Als Muskelrelaxans und Analgetikum 2,5-10mg 2x täglich
Cannabisblüten in Einzeldosen zur Inhalation nach Verdampfung NRF 22.13. THC > 10%	25-27%	3 min	25 -50mg Inhalation mit Verdampfer 1x täglich	Steigerung der Dosis um 25–50mg alle 1-3 Tage , je nach THC-Gehalt der Blüte
Cannabisblüten in Einzeldosen zur Inhalation nach Verdampfung NRF 22.13. THC < 10 %	25-27%	3 min	50 – 100mg Inhalation mit Verdampfer 1x täglich	Steigerung der Dosis um 50–100 mg alle 1–3 Tage , je nach THC-Gehalt der Blüte

[Hier eingeben]

REMEDIUM420-Dosierungsempfehlungen nach NRF

Cannabisblüten in Einzeldosen zu 0,25mg/ 0,5mg/0,75mg/1g zur Teezubereitung NRF 22.15.	4-12%	30 min -4h	Nach 15 min Kochen, abseihen und abends 200 ml (1 Tasse) trinken	Bei unzureichender Wirkung morgens eine zweite Tasse trinken
Dronabinol-Kapseln 2,5mg/5mg/10mg NRF 22.7.	10-20%	30 min -4h	Vor der Mahlzeit 1 Kapsel täglich	Als Muskelrelaxans und Analgetikum 2,5-10mg 2x täglich
Ethanolische Dronabinol-Lösung 10mg/ml zur Inhalation NRF 22.16.	10-20%	30 min -4h	0,5-1mg Dronabinol individuell und indikationsbezogen	Steigerung je nach Beschwerdegrad und Therapieerfolg
Ölige Cannabidiol-Lösung 50mg/ml, 100mg/ml, 200mg/ml, 400mg/ml NRF 22.10. FAM: Epidiolex®	6-19%		Einnahme mit fetthaltiger Nahrung, nicht mit Wasser Dosierung individuell und indikationsbezogen Wenige mg bis mehrere hundert mg 5mg/kg Körpergewicht	Steigerung je nach Beschwerdegrad und Therapieerfolg max. 10mg/kg – 20mg/kg Körpergewicht

[Hier eingeben]

REMEDIUM420-Dosierungsempfehlungen nach NRF

<p>Ölige Cannabisölharz-Lösung 25mg/ml Dronabinol NRF 22.11. FAM: Marinol®</p>	<p>10-20%</p>	<p>30 min – 4h</p>	<p>Einnahme mit fetthaltiger Nahrung, nicht mit Wasser 1-2,5mg (4 Tropfen) 1-2x täglich</p>	<p>Steigerung um 2,5mg (4Tropfen) alle 3 Tage, bei unzureichender Linderung der Beschwerden. Keine weitere Dosisanpassung bei ausreichender Linderung. Als Muskelrelaxans und Analgetikum 2,5-10mg 2x täglich</p>
<p>Ölige Dronabinol-Tropfen 25mg/ml NRF 22.8. FAM: Marinol (in Sesamöl gelöst)</p>	<p>10-20%</p>		<p>Einnahme mit fetthaltiger Nahrung, nicht mit Wasser 1,7-2,5mg (4 Tropfen) 1-2x täglich</p>	<p>Steigerung um 2,5mg (4Tropfen) alle 3 Tage, bei unzureichender Linderung der Beschwerden. Keine weitere Dosisanpassung bei ausreichender Linderung. Als Muskelrelaxans und Analgetikum 2,5-10mg 2x täglich</p>
<p>Synthetisches THC (1mg = 7mg THC) Nabilon FAM: Canames®</p>	<p>10-20%</p>	<p>30min – 4h</p>	<p>1mg</p>	<p>Langsamem Steigerung auf max. 6mg täglich</p>
<p>Dickextrakt aus Cannabis sativa (THC 27mg und CBD 25mg/ml einschl. Terpene & Flavonoide) Nabiximol FAM: Sativex®</p>	<p>10-20%</p>	<p>2 – 4h</p>	<p>1 Sprühstoß (= 2,7mg THC und 2,5mg CBD)</p>	<p>Langsamem Steigerung auf max 12 Sprühstöße</p>

[Hier eingeben]